



STYRIAFERT
performance pro

STYRIAFERT Powerkorn

organisch-mineralischer NP-Dünger

Nährstoffzusammensetzung

8,0%	N	Gesamtstickstoff organisch gebunden
11,0%	P ₂ O ₅	Gesamtphosphat
5,0%	P ₂ O ₅	neutral-ammoncitrat lösliches Phosphat

Nebenbestandteile

15,0%	CaO	Kalziumoxid gesamt (basisch wirkende Bestandteile)
0,2%	MgO	Magnesiumoxid gesamt
0,1%	S	Schwefel gesamt
65% organische Substanz (bewertet als Glühverlust)		
C/N Verhältnis 4		
ph-Wert 6,6		
chloridarm		

Ausgangsstoffe

Herstellung unter Verwendung von tierischen Nebenprodukten (Material der Kategorie 3 gemäß Art. 10 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009; Fleischknochenmehl), mit Kohlensäurem Kalk

Wirksamkeit

- » Verbesserung des Wurzelwachstums
- » Steigerung des Ernteertrags
- » bestens geeignet zu Zeiten eines hohen N-Bedarfs auch bei kurzem Wachstumszyklus
- » langfristige Phosphorversorgung bei schwach sauren bis sauren Böden
- » hohe Auswaschsicherheit der Nährstoffe
- » verbessert die Bodenstruktur
- » erhält Bodenfruchtbarkeit langfristig
- » fördert den Humusaufbau und damit die Bodengesundheit
- » effektiver Wasserspeicher
- » aktivierte Mikroorganismen
- » gut streufähig durch Pelletform

Anforderungs-Konform

- » entspricht EU-BIO-Verordnung VO (EG) 834/2007 bzw. VO (EU) 2018/848
- » Gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland
- » Zugelassen für z.B. Ecovin (Stand 05/23)

Anwendungshinweise

Ausbringung mit handelsüblichem Streugerät. Niederschläge nach Ausbringung beschleunigen die Wirkung. Je nach Bodenfeuchte und Witterung erste Wirkung nach einer Woche. Ca. 80-90% des Gesamtstickstoffs können im ersten Jahr angerechnet werden. Bei Lagerung, Transport und Ausbringung sind notwendige Vorkehrungen zu treffen, um die Aufnahme durch Nutztiere zu vermeiden. Bei der Anwendung auf

landwirtschaftlich genutzten Ackerflächen sind Stoffe sofort einzuarbeiten. Keine Anwendung auf landwirtschaftlich genutztem Grünland. Auf sonstigen Grünflächen einschließlich Zierrasen, Sportrasen etc. nach der Ausbringung wässern. Keine Mischung mit Futtermitteln. Zugang für Nutztiere zu den behandelten Flächen während eines Zeitraumes von mind. 21 Tagen nach der Ausbringung verboten.

Anwendungsbereich

Anwendung in der Landwirtschaft, sowie im Gemüse-, Obst- und Gartenbau

Obst	Junganlage	300 - 500 kg/ha	Frühjahr
	Ertragsanlage	500 - 600 kg/ha	Frühjahr
	Beerenobst	500 - 600 kg/ha	Frühjahr
Gemüse	Spinat	1000 - 1200 kg/ha	vor dem Anbau
	Weiß-/Rotkraut	1400 - 1700 kg/ha	vor dem Anbau
	Leguminosen	400 - 600 kg/ha	vor dem Anbau
	Tomaten	600 - 800 kg/ha	vor dem Anbau
	Paprika	600 - 800 kg/ha	vor dem Anbau
	Kürbis	500 - 600 kg/ha	vor dem Anbau
Feldfrüchte	Kartoffel	700 - 1400 kg/ha	vor dem Anbau
	Mais	1000 - 1200 kg/ha	vor dem Anbau
	Zuckerrübe	600 - 900 kg/ha	vor dem Anbau
Weinbau		300 - 500 kg/ha	Frühjahr

Empfehlungen der amtlichen Beratung gehen vor.

Lagerungshinweise

Kühl und trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Für Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren. Bei sachgemäßer Lagerung mehrere Monate ohne Qualitätseinbußen haltbar.

Lieferung

- » Big Bag 500 kg
- » Big Bag 1000 kg
- » Säcke 25 kg
- » Pellets

Schüttdichte

660 kg/m³

